

## NWAPC EXÁMENES DE POZO

Estos son recomendaciones de la academia de pediatría

EDAD	TIPO DE VISITA	VACUNA	Cantidad	LABORATORIA	FECHA DE VACUNA
3-7 días	Examen de Pozos				
2 semanas	Examen de Pozos				
2 meses	Examen de Pozos	Pentacel*, Neumococco, Rotovirus, Hep B	3 inyecciones, 1 oral		
4 meses	Examen de Pozos	Pentacel*, Neumococco, Rotovirus,	2 inyecciones, 1 oral		
6 meses	Examen de Pozos	Pentacel*, Neumococco, Rotovirus, Hep B, Gripe +/-*	3-4 inyecciones, 1 oral		
9 meses	Examen de Pozos	Gripe +/-	0-1 inyecciones	Anemia +/- Plomo	
12 meses	Examen de Pozos	Hep A, Prevnar, MMR VZ Gripe +/-	4-5 inyecciones		
18 meses	Examen de Pozos	Hep A, Pentacel* Gripe +/-	0-1 inyecciones	MCHAT (pantalla de autismo)	
2 años	Examen de Pozos	Gripe +/-	0-1 inyecciones	MCHAT (pantalla de autismo)	
3 años	Examen de Pozos	Gripe +/-	0-1 inyecciones		
4 años	Examen de Pozos	Kinrix*, *ProQuad* Gripe +/-	0-1 inyecciones		
5 años	Examen de Pozos	Gripe +/-	0-1 inyecciones	audición y visión	
6 años	Examen de Pozos	Gripe +/-	0-1 inyecciones	audición y visión	
8 años	Examen de Pozos	Gripe +/-	0-1 inyecciones	audición y visión	
10 años	Examen de Pozos	TDAP, Menactra Gripe +/-, HPV*	2-3 inyecciones		
12 años	Examen de Pozos	Gripe +/-, HPV*	0-2 inyecciones		
13 años	Examen de Pozos	Gripe +/-, HPV	0-2 inyecciones		
14 años	Examen de Pozos	Gripe +/-, HPV	0-2 inyecciones		
15 años	Examen de Pozos	Gripe +/-,	0-1 inyecciones		
16 años	Examen de Pozos	Menactra, Gripe +/-, Bexsero	1-3 inyecciones		
17-21 años	Examen de Pozos	Gripe +/-, Bexsero	0-2 inyecciones		

- El horario típico de visitas al buen precio es anual de 2-6 años, cada dos años de edad de 6-12 años, luego anualmente de 12-21 años.
- Los exámenes físicos escolares/los exámenes físicos son parte del examen de pozo.
- Crecimiento y desarrollo se abordarán en cada visita de pozo. Para reducir el número de inyecciones, se utilizan vacunas combinadas siempre que sea posible. El componente individual de las vacunas combinadas mencionadas anteriormente es el siguiente: Pentacel (DTaP, IPV, y Hib), Kinrix DTaP, IPV), and Proquad (MMR, Varicella). Algunos proveedores usan Pediarix (DTaP, IPV, HepB) en lugar de la serie de pentacel.
- Típicamente, la vacuna de gripe se administra por Septiembre a Mayo y puede administrarse en Las Exámenes de pozo para los 6 meses de edad y más. (para las edades de seis meses a 35 meses la obtención de la primera vacuna contra la gripe requerirá la cita de la enfermera para un refuerzo de la vacuna de 4 a 6 semanas después de la primera vacuna contra la gripe administrada)
- Si la primera dosis de VPH se administra antes de los 15 años, requerirán una vacuna de refuerzo para una protección completa frente a tres vacunas para completar la protección después de los 15 años.
- Bexsero se da típicamente a los 16 años con un refuerzo antes de la universidad o la vida adulta joven
- Gripe, HPV, Bexsero vacuna se recomiendan, pero no se requieren para la escuela
- ADA recomienda la aplicación de flúor cada seis meses en la irrupción de los dientes hasta que se establezca el cuidado dental de rutina.
- Condiciones como ADHD, asma, y problemas de desarrollo, pueden necesitar un seguimiento más frecuente con anterioridad.

**Por favor programe su examen de pozo hoy: (479) 443-3471**

Proveedor: DR SIMMONS

**NWAPC EXÁMENES DE POZO**

Estos son recomendaciones de la academia de pediatría