

CIRCUNCISION

opciones de procedimiento y cuidado posterior al procedimiento

¿Qué es una circuncisión?

Al nacer, el niño tiene una piel que cubre el extremo del pene, llamada prepucio. La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio, exponer la punta del pene. La circuncisión generalmente la realiza un médico en los primeros días de vida.

en nuestra oficina usamos dos métodos diferentes para circuncidar:

1. **PLASTIBELL:** Este procedimiento se realiza con el paciente al que se le administra anestesia local para ayudar a adormecer el área. el método Plastibel consiste en colocar un anillo de plástico transparente en la punta del pene. Una cuerda alrededor del prepucio, cortando el flujo de sangre. Se recorta el exceso de piel sobre el Plastibell. El anillo de plástico permanece en su lugar hasta la punta del pene, donde debe caerse alrededor de 5 a 10 días después del procedimiento.

2. **GOMCO:** este procedimiento comienza cuando se administra anestesia local al paciente para ayudar a adormecer el área. El prepucio se separa de la cabeza del pene y se coloca un dispositivo en forma de campana (se puede hacer una incisión en el prepucio para permitir esto). Luego se levanta el prepucio y se aprieta una pinza, luego se extrae el prepucio con un bisturí. Se retira el dispositivo y se coloca un apósito de vaselina en el pene.

Cuidados posteriores para cada método:

Con cualquiera de los dos procedimientos, es posible que su hijo esté molesto durante algunas horas después del procedimiento.

1. **PLASTIBELL:** El borde de plástico generalmente se cae entre 5 y 10 días después. Llame a nuestra oficina si el borde no se ha caído 10 días después de la circuncisión o si el borde se ha deslizado por el eje del pene. No es necesario un vendaje especial. **No uses vaselina.** Un anillo de color marrón oscuro o negro que rodea el borde de plástico es normal y desaparecerá después de que se caiga el borde. Solo báñese con una esponja hasta que el Plastibell se caiga.

2. **GOMCO:** After removing the initial Vaseline dressing, apply a small amount of Vaseline to a gauze pad, and place over the circumcised area with eah diaper chnge for the next 3-5 days. This will prevent the diaper from sticking to the healing skin. it is normal for the first few diaper changesto show some spotting of blood. Clean gently and avoid rubbing. Do not worry if there

una cita si: a moist, yellow coating over the head of the penis.

Llame a nuestra oficina o programe una cita si:

- * El paciente desarrolla fiebre de 100.4 o superior.
- * Si las manchas de sangre en el pañal se vuelven más y más abundantes, en lugar de menos y menos.
- * El paciente no ha orinado ocho horas después del procedimiento.
- * El área del procedimiento tiene hinchazón y/o drenaje tipo purulenta con mal olor.
- * El anillo Plastibell se desliza por el eje del pene.
- * Plastibell no se ha caído después de 10 días.